

BOLI ALE ANALIZATORILOR

NUMELE BOLII	ORGANUL AFECTAT	CAUZE	PREVENIRE	MANIFESTARE	TRATAMENT
DERMATITA	pielea (analizatorul cutanat)	vârsta	Este important sa se evite orice factori care declanseaza iritatiea. In cazul in care un aliment este identificat ca alergen, el trebuie eliminate din dieta. Preventia scarpinarii este un factor important in dermatita atopica. Este contraindicat scarpinatul iritatiei. Este recomandata aplicarea de comprese care sa amelioreze mancarimea.	plăci roșii aspre acoperite cu vezicule	aplicarea cremelor corticosteroide
		alergiile, astmul		apariția de cruste	aplicarea anumitor creme sau loțiuni care stimulează sistemul imunitar
		mediul de desfășurare al activităților		minorii cresc rapid în masă și sunt agitați	expunerea zonei afectate la cantități controlate de lumină naturală sau artificială (fototerapie)
		insuficiență cardiacă		senzația de durere sau arsură	
		Parkinson, HIV, ...		roșeață	
GLAUCOMUL	ochiul (analizatorul vizual)	control oftalmologic complet	Ochii produc in permanenta un lichid transparent (umoare apoasa) care circula in camera anterioara a globului ocular cu rolul de a-l hrani. In mod normal, cantitatea de fluid produsa, respectiv eliminata, este aproximativ aceeasi si, in felul acesta, se mentine o presiune constanta. Atunci cand se inregistreaza valori mai mari, ochiul produce lichidul, dar nu il mai poate elimina in aceeasi masura, pentru ca are loc (din cauze necunoscute, inca) un blocaj. Consecinta este ca fluidul se acumuleaza in interior. Presiunea intraoculara crescuta deterioreaza nervul optic si, in timp, poate duce la orbire.	observarea de halouri în jurul punctelor luminoase	Tratamentul medicamentos local
		cunoașterea istoricului familial		pierderea vederii	
		exerciții fizice		ochi roșii	Tratamentul medicamentos general
		protejarea ochilor		durere oculară	
				îngustarea câmpului vizual (vedere în tunel)	Laser terapie
OTITA	urechea (analizatorul auditiv și vestibular)	Cauzele care stau la baza otitei medii acute sunt infecțiile cu anumite bacterii, categorie din care fac parte Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis și mai rar Pseudomonas aeruginosa și Stafilococcus aureus.	Otita medie acută se poate preveni prin mai multe mijloace. Astfel, este important să se evite locurile aglomerate în timpul perioadelor de gripă și răceală, dar și contactul cu persoanele infectate. O altă metode de prevenție utilă este vaccinarea antipneumococică și creșterea imunității organismului.	durere la nivelul urechii, uneori resimțită ca un junghi puternic	Tratamentul constă în antibiotice, pentru combaterea infecției, analgezice, pentru diminuarea durerii, și antitermice, pentru scăderea febrei; medicamente pentru desfundat nasul sau medicamente antialergice și o bună igienă a urechii, care implică curățarea sa cu diferite soluții auriculare, dar și a nasului.
				febră	
				greață	
				stare generală de disconfort	
				senzație de ureche înfundată	
				scăderea auzului	